

	průběh bolesti	hypestezie	oslabené a změněné reflexy	oslabení svalů či pohybu	další příznaky	zkouška
C6	radilní strana HK, do palce a ukazováčku, někdy až ke třetímu prstu	radilní strana HK, do palce a ukazováčku, někdy až ke třetímu prstu	oslabený radiopronační reflex (klepnutím na processus styloideus radi z volární strany; HK držíme stejně jako při vybavování styloradiálního reflexu)	pronace	někdy scapula alata (test předpažení HK)	
C7	dorzální strana HK, do středních prstů	dorzální strana HK, do středních prstů	oslabený tricipitový reflex	m. triceps brachii		
C8	ulnární plocha HK, ke čtvrtému a pátému prstu, někdy až ke třetímu	ulnární plocha HK, ke čtvrtému a pátému prstu, někdy až ke třetímu	flexorový reflex	flexe prstů (slabší stisk ruky), abdukce malíku	někdy atrofie drobných ručních svalů	
L4	ventrální plocha stehna ke kolenu, může pokračovat po anteromediální ploše bérce až po vnitřní kotník a výjimečně na mediální hranu palce	přední plocha stehna v dermatomu L4	pattelární (snížen nebo může chybět)	m. quadriceps femoris, flexory kyčlí a někdy adduktory	obtížná chůze po schodech, obtížené zvedání z dřepu na postižené DK	„obrácený Laségue“
L5	zevní plocha stehna a bérce („lampas“), po nártu k prvnímu až třetímu prstu	zevní plocha stehna a bérce („lampas“), po nártu k prvnímu až třetímu prstu	žádný běžně vyšetřovaný reflex nebývá změněn	m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis a u těžkých případů m. tibialis anterior; hypotonie souběžně s hranou tibie a pod zevním kotníkem; oslabena ZR v kyčli	patologická bariéra při protažení meziprstní kožní řasy mezi palcem a 2. prstem; zvýšený odpor při vzájemné pohyblivosti 1. a 2., a 2. a 3: metatarzu (zejména když bolest vyzařuje k prstům); u akutních lézí nemocný nemůže zvedat koleno s „stepuje“	u závažnějších případů při oslabení m. tibialis anterior nemocný při chůzi po patách na postižené straně nedostatečně zvedá chodidlo („signe du talon“)
S1	postero-laterální plocha stehna a lýtka k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu	postero-laterální plocha stehna a lýtka k zevnímu kotníku a dále po laterální ploše chodidla k malíku a 4. prstu	reflex Achillovy šlachy	mm. fibulares, m. triceps surae (zejm. laterální část) , gluteální svalstvo (oslabené a hypotonické)	zvýšené odpory v meziprstní řase mezi 3. a 4. a 4. a 5. prstem a při vzájemném pohybu metatarzů 3. a 4. a 4. a 5.	Véleho test na flexory prstů; při poruše propriocepce stestujeme dle Véleho prahovou rychlost, při níže nemocný pozná pohyb v kloubu a porovnává se zdravou stranou

Zpracováno na základě literatury : **Lewit Karel : Manipulační léčba v myoskeletální medicíně**, 5. přepracované vydání, str. 310 - 314

© physiotherapy.cz/edu/